


冊數 2
定價 260!
備註

五十二



本草綱目卷之

地黃丸
一兩加入白沙糖

先期剝取淨肉貯瓷碗內每肉一兩加入白沙糖
一錢素體多火者併加西洋參片如糖之數畧以
絲綿一層日日放飯鍋內蒸之蒸至百次者良謂
之代參膏較生煎者功百倍矣晚時開水淪之其
汁盡出如遇難產卽併牛膝酒共淪更覺簡便凡
氣血不足別無痰滯便滑之病者不論男婦皆可
蒸服殊勝他劑也

米飲調服二錢則臨盆迅速

胎元不足者勿服

產後瘀

血不淨變生病者或兒枕痛於本方內加炒紅麴

三錢酒炒馬料豆二合共為末用童便半杯陳酒

半盃調服二三錢即愈唯鳳仙子只於臨盆時用

仙傳通津救命玉靈湯治裂胞生及難產數日血

水已乾產戶枯澀命在垂危者

龍眼肉

去核六兩

生牛膝梢

一兩黃酒浸搗爛

將龍眼肉煎濃

汁沖入牛膝酒內服之停半日即產親救數人無

不奇驗

雄按龍眼甘溫極能補血大益胎產力勝參耆宜

草根

五兩

加水煎之

紫酒

治妊娠腰痛如折

黑料豆

二合炒熟焦

白酒一大碗煎至七分空心服

仙傳回急保生丹

此方得之神感效驗異常

大紅鳳仙子

九寸粒

白鳳仙子

四十粒

自死龜板

一兩麻油塗炙

通梢懷牛膝

三錢

桃仁

一錢五分

川芎

五錢

白歸身

五錢

鳳仙子研末包好臨產時將餘藥稱

明分兩為末配入臨盆時米飲調服二錢遲則再

服一錢交骨不開者即開難產者不過三服臨

盆一月內本方去鳳仙子入益母膏二兩每日早

又按此丸兼能調經種子大有殊功

石磐石

懷山藥

四兩 炒

杜仲

去粗皮淨三兩 鹽水炒斷絲

川續斷

二兩

炒

共

為末糯米糊為丸如菉豆大每服三錢米

湯送下

刀雖平常屢用屢驗乃異人所授也凡胎

欲墮者

服即保住慣小產者宜常服之或每月

服數次

主慣半產之月即服之無不保全

銀芩酒

治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍及胎漏下

血

芩根

二兩

紋銀

五兩

酒一碗

如無芩之處用茅

凡易滑胎者自無事且易產

白茯苓

二兩

於朮

一兩米泔浸一日黃土炒香

條芩

一兩酒拌炒

香附

兩童便浸炒

延胡

一兩米醋炒

紅花

一兩隔紙烘乾

益

母草

淨葉去梗一兩

眞沒藥

三錢瓦上焙乾去油

右爲末蜜丸

桐子大每服七丸白滾水下若胎動一日可服三

五次切不可多服一丸至囑

杰按胎滑自是血熱動胎之故方中紅花行血延

胡走而不守恐非保胎所宜况已有香附行氣氣

行血白不滯何取動血之品宜去之爲穩

雄按每服七丸故有奇效而無小損也毋庸裁減

蒼朮

五升浸

一厚樸

薑製炒

陳皮

各三觔去白

甘草

三十兩炒

右爲末每服五錢加薑三片棗一個煎入鹽一捻

沸湯點服亦得

見丹溪書

安胎方

黃耆

蜜炙

杜仲

薑汁炒

茯苓

各一錢

黃芩

一錢五分

白朮

生用五分

阿膠珠

一錢

甘草

三分

續斷

八分

胸

中脘滿加紫蘇陳皮各八分

下紅加艾葉地榆

各二錢并多加阿膠引用糯米百粒酒二杯煎服

腹痛用急火煎

保胎神佑丸 此方屢驗一有孕卽合起每日服之

女和車

麻仁丸

治便難脾約

大黃

四兩

厚樸

枳實

即大承氣去芒硝也

麻仁

一兩

杏仁

二兩去皮麩炒

芍藥

蜜丸梧子大每服三五

十九

溫水下脾約丸

丹溪麻仁丸

治同上兼治風秘

郁李仁

麻子仁

各六兩

大黃

二兩半以

山

藥

防風

枳殼

七錢

檳榔

五錢

羌活

木香

錢半

蜜丸梧子大服七十九白湯下

平胃散

局方

治脾有停滯痰飲痞膈宿食不消滿悶

唐瀉

加樸硝善腐死胎論見產類

黃蠟

二兩

白礬

一兩

先將蠟融化候少冷入礬和

勻為丸酒下每服十丸二十九漸加至百丸則有

力瘡愈後服之亦佳

太乙膏

治癰子瘡神効

丹溪

腦子

一錢

輕粉

乳香

各二錢研

麝香

三錢研

沒

藥

四錢研

黃丹

五兩

右用清油一觔先下黃丹熬

用柳枝攪又用葱兒葱七枝先下一枝熬焦再下

一枝葱盡為度下火不住手攪觀冷熱得所入腦

子等藥攪勻磁器盛之用時旋攤

潤下

琥珀

花蕊石

各一錢

為細末醋糊丸如彈子大每

用一二丸炭火煨紅投入生薑自然汁中浸碎以

童便合酒調灌下

托裏散

治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脈弦洪

實數腫甚欲作膿者亦治產後瘀血將成膿

論見前

金銀花

當歸

二兩

大黃

樸硝

花粉

連翹

牡蠣

皂角刺

三錢

黃芩

赤芍

一錢

每五錢

半酒半

水煎

蠟礬丸

治一切瘡癤惡毒先服此丸護膜托裏使

毒不攻心或為毒蟲蛇犬所傷並宜服之

錢二

右爲末用溫酒熱湯各半盞調灌一二錢能下咽
卽開眼更宜燒漆氣淬醋炭于牀前使聞其氣

伏龍肝散 治大小產血去過多不止

伏龍肝

黑龍丹 亦名琥珀 治產難及胞衣不下血迷血暈不

省人事一切危急惡候垂死者但灌藥得下無不全

活亦治產後疑難雜證 案見奇證中

當歸 五靈脂 淨者 川芎 良薑 熟地 各二兩

砂鍋內紙筋鹽 百草霜 一兩 硫黃 乳香 各二錢

不計其數

五

不省人事

蒲黃

五靈脂

淨者

等分炒爲末煎膏醋調服或用

二三錢酒煎熱服

如神湯

治瘀血腰痛下注兩股如錐刺

延胡

當歸

肉桂

等分水煎服

二味參蘇飲

人參

蘇木

清魂散

嚴氏

治產後惡露已盡忽昏暈不知人

產後氣虛

風邪又感

澤蘭葉

人參

各二錢半

荊芥

兩

川芎

五錢

甘草

或寒凝惡露不行

花蕊石

四兩

硫黃

壹兩

研細泥封煨赤服一錢童

便下

又葛可久花蕊石散

治畧同上

花蕊石

煨存性研如粉以童便一盞男人入酒

少許女人入醋少許煎溫食後調服三錢甚者五

錢能使瘀血化爲黃水後用獨參湯補之

非寒凝者不宜

此

無極丸

治惡露不行發狂譫語血瘀之重者

矢笑散

局方

治惡露不行心包絡痛或死血腹痛不

沒藥

去油二錢

血竭

壹錢

共研末分兩服糖調酒下

奪命丹

良方

治瘀血入胞脹滿難下急服此即消胞

衣自下

杰按似與前論惡閉致喘證未對姑列此以俟再

考

附子

炮半兩

乾漆

碎之炒烟盡

牡丹皮

各一兩

右為細末另用大黃末一兩以好醋一升同熬成

膏和前藥丸桐子大溫酒吞五七丸一方有當歸

壹兩

花蕊石散

治血入胞衣脹大不能下或惡露上攻

樸硝 丹皮 當歸 大黃 桃仁生用各三銖 厚

樸 桔梗 人參 赤芍 茯苓 桂心 甘草

牛膝 橘皮各二銖 附子六錢 蠱蟲 水蛭各十枚

右十七味咬咀以清酒五升水五升合煮取三升分四服日三夜一每服相去三時覆被取微汗天寒汗不出著火籠之必下膿血務須斟酌下盡二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡不盡忍之尤妙

奪命散 治產後惡露不行眩暈昏冒論見產後眩暈門及惡露

不來

小薊

蒲黃

炒黑

藕節

滑石

木通

生地

梔子

炒

淡竹葉

當歸

甘草

各五分

導赤散

錢氏

治小腸有火

使赤淋痛

論見帶下類

生地黃

木通

甘草

淡竹葉

等分煎

血極膏

羅謙甫

治婦人汚

血凝滯胞門致成經閉

論見

經閉類

大黃一味爲末醋熬成膏服之利一二行經血自

下

血胞湯

千金

治二三十年

不產育胞中必有積血

論見

求子

小柴胡湯

仲景

治傷寒

少陽證往來寒熱胸脇

痞滿默默不欲食心煩喜

嘔或腹中痛或脇下痛或

渴或咳或利或悸小便不

利口苦耳聾脈弦或汗後

餘熱不解及春時嗽發瘧

寒熱婦人傷寒熱入血室

小柴胡在經主氣在臟
主血故更能入血室

柴胡八兩

半夏半升

人參

甘草

黃芩

生薑三兩

大棗十二

枚

理血

小蘗飲子

治男婦下焦

熱結尿血淋漓

痛者為血
淋不痛者

為溺血論見
妊娠經來類

女斗竭

卷下

哭

神効湯活人云有代赭旋覆證氣虛者先服四逆湯後服此湯為良

旋覆花即金沸草三兩 代赭石壹兩 人參二兩 甘草三兩

半夏升半 生薑五兩 大棗十二枚

旋覆花湯金匱要畧

旋覆花 葱 新絳

逍遙散局方 治血虛肝 骨蒸潮熱口乾便澀月經

不調

柴胡 當歸酒拌 白芍酒炒 白朮土炒 茯苓壹錢

甘草炙五分 加煨薑薄切煎本方加丹皮梔子名

加味逍遙散

又抑氣散嚴氏治婦人氣盛於血變生諸證頭暈膈滿

香附四兩 陳皮壹兩 茯苓 甘草炙 爲末每服二錢

抑青丸 大瀉肝火治左脇作痛婦人怒氣傷肝胎氣上逆致嘔逆水飲不能入黃連一味吳萸湯浸一宿爲丸

代赭旋覆湯仲景治傷寒發汗若吐若下解後心下

痞鞭噫氣不除邪雖解胃不和虛氣上逆故也

又周揚俊曰余每借以治反胃噎食氣逆不降者

女科朝要

天仙藤散

陳景初製木名香

附散治子氣腫脹

天仙藤

即青木香藤洗畧焙

香附炒

陳皮

甘草

烏

藥

木香等分

劉末

每服五錢加生薑三片紫蘇

五葉水煎日三服腫

消止藥

汪本無木香有木

瓜

木香散

王師復

治妊娠四

五月後每胸腹間氣刺滿痛

或腸鳴嘔逆減食

此由飲食失節所致

義光

木香

丁香

甘草

鹽湯下

抑氣散

丹溪

治婦人經

將行而痛氣之滯也

四物加胡索

丹皮

條芩

杜刮橘紅

石菖蒲

半夏麴

半夏亦可

膽星

茯苓

神

旋覆花

各一錢煎濾清

服

理氣

紫蘇飲

嚴氏

治胎氣不

和湊上心胸腹滿痛悶名為

子懸

胎至四五月君相養胎熱氣逆上之故

二火

紫蘇

兩

腹皮

人

參

川芎

橘皮

白芍

當歸

三

甘草

分

剉分三分水一盞生

薑四片葱白煎去渣服一方

無川芎名七寶散

汪訥菴醫方集解載此蘗葉

止一錢

當歸七分

甘草二分

餘皆五分

右五味水六升煮取二升半分三服

千金橘皮湯 治妊娠嘔吐不下食

竹茹 橘皮 人參 白朮各十銖 生薑一兩 厚

樸十二銖製

右六味水七升煮取二升半分三服附金匱單用

橘皮湯又橘皮三升 茹二升 人參一兩 甘草五兩 生薑半

大棗三十枚 名橘皮竹茹湯均治噦逆後人又因金匱加半夏赤

芩朮杷葉亦名橘皮竹茹湯治虛人嘔逆

六神湯 治產後痰迷神昏譫語惡露不斷者甚或

半身不遂口眼歪斜方論見前

後案中

九令能食便強健也忌生冷醋滑油膩方論見惡阻門

千金茯苓圓

茯苓

人參

桂心熬

乾薑

半夏

橘皮各一

白朮

葛根

甘草

枳實

各二兩

石十味蜜丸梧子大

飲服二十九漸加三十丸日

三

附後不用乾薑半根止用五物又云

夏橘皮白朮葛根

又方

此在景岳全書名竹筴湯

治孕

婦嘔吐不止惡心少食服此

止嘔清痰

青竹筴

橘皮

各十銖

茯苓

生薑

各二兩

半夏

三十銖

半夏 生薑各三 乾地黄 茯苓各十 橘皮

旋覆花 細辛 人參 芍藥 芎藭 桔梗

甘草各十 車氏祇用八味去細辛川芎桔梗
二銖 之升提芍藥之酸斂尤為盡善

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服若病

阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變客熱煩

渴口生瘡者去橘皮細辛加前胡知母各十二銖

若變冷下利者去地黄入桂心十二銖若食少

中虛生熱大便閉塞小便赤少者宜加大黃十八

銖去地黄加黃芩六銖餘依方服一劑得下後

息看氣力冷熱增損方更服一劑湯便急使茯苓

五錢

甘草

二錢半炙

每服一兩加薑棗煎

愈風散

華陀

治產後中風口喎角弓反張亦治血暈

不省人事四肢強直

方見產後角弓類亦名如聖散

化痰

二陳湯

局方

治一切痰飲為病咳嗽脹滿嘔吐惡心

頭眩心悸

半夏

薑製二錢

陳皮

去日

茯苓

錢一

甘草

五分

加薑

煎

半夏陳皮貴其陳久則無燥散之患故名二陳

千金半夏茯苓湯

治妊娠惡阻煩悶吐逆惡食頭

眩體重惡寒汗出等症

中寒服後稍輕再加當歸 煩躁不大便去桂附

倍芍藥加竹瀝熱去附子入白附子亦可 如不

大便日久胸中不快加大黃枳殼如藏寒下利去

黃芩防已倍附子加朮 嘔逆加半夏 語言蹇

澁手足戰掉加萸蒲竹瀝身痛發搖加羌活 口

渴加麥冬花粉 煩渴多驚加犀角羚羊角汗多

去麻杏加白朮 舌燥去桂附加石膏 參丹溪心法

獨活湯 丹溪 治風虛癱瘓昏愢不覺或爲寒熱

獨活 羌活 防風 細辛 桂心 白微 當

歸 川芎 半夏 人參 茯神 遠志 萸蒲

槲

六兩

黃連

一兩

乾薑

十兩

川椒

去汗

當歸

四兩

苦酒

醋也

浸烏梅一宿去核蒸熟和藥蜜丸

祛風

小續命湯

千金

治中風不省人事神氣潰亂半身不

遂筋急拘攣口眼喎斜語言蹇澁風溼腰痛痰火併

多六經中風及剛柔二瘕亦治產後中風

論見前

麻黃

去節

杏仁

去皮尖炒研

桂枝

白芍

酒炒

甘草

炙

人參

川芎

黃芩

防己

每一兩

防風

半兩

附子

半兩炮去皮臍

每服三錢或四五錢加薑棗煎溫服

取微汗

筋急語遲脈弦者倍人參去芩芍以避

寒相搏咳者加五味子細辛乾薑小便利去茯苓

下利去芍藥加乾薑嘔去附子加生薑一倍

附子湯仲景治少陰病身軀痛手足寒骨節痛脈沉

者及少陰病得之二三日口中和背惡寒者

前方去生薑加人參二兩

烏梅丸仲景治傷寒厥陰證寒厥吐虵傷寒藏厥者

微而厥至七八日膚冷發燥無暫安時也虵厥者虵

上入隔則煩須臾復止得食則嘔而又煩虵聞食臭

復出也此為藏寒當與此丸溫藏安虵亦治胃府發咳咳而嘔嘔甚則

長蟲出亦主久利

烏梅三百

細辛

桂枝

人參

附子

黃

附子

一枚 主用

乾薑

一兩

甘草

二兩 炙

冷服面赤者格

陽於上也加葱九莖以通陽腹痛者真陰不足也

加芍藥二兩以斂陰咽痛陰氣上結也加桔梗一

兩以利咽止痛脈不出加人參二兩以助陽補氣

血嘔吐加生薑二兩以散逆氣上皆通脈四逆湯加減之法

真武湯

仲景

治少陰傷寒腹痛小便不利四肢沉重

疼痛自下利者此為有水氣或咳或嘔或小便利及

太陽病發汗汗出不解仍發熱心悸頭眩筋惕肉瞤

振振欲擗地氣寒惡寒

此亦腎中陽虛見症仍屬少陰方名真武蓋取固腎之義

附子

一枚 炮

白朮

二兩 炒

茯苓

三兩 兩

芍藥

三兩 炒

生薑

三兩 水

白朮

陳壁土炒二兩

人參

乾薑

炮

甘草

炙一兩

每服

四錢本方等分蜜丸名理中丸

附子理中湯

治中寒腹痛身痛四肢拘急

即前方三兩加附子一枚

補中湯

治泄瀉瀉不已者加附子

理中湯加陳皮茯苓

改加青皮陳皮名治中湯

治太陰傷寒腹滿痞悶兼食積者

四逆湯

仲景

治三陰傷寒身痛腹痛下利清穀惡寒

不汗四肢厥冷或反不惡寒面赤煩躁裏寒外熱或乾嘔或咽痛脈沉微細欲絕

薄耳其不名桂枝加芍藥而名建中以飴糖為君也今人用建中者不用飴糖失仲景遺意矣

黃耆建中湯

金匱

治虛勞諸不足

準繩曰血不足而

生血此仲景之妙法蓋稼穡作甘甘能補胃胃為氣血之海氣血所從生也即補血湯者五倍於當歸之義

即前方加黃耆兩半黃耆易當歸名當歸建中

湯

治產後虛羸不足腹中痛引腰背小

理中湯

仲景

治傷寒太陰病自利不渴寒多而嘔腹

痛糞澹脈沉無力或厥冷拘急或結胸吐寒虺及感

寒霍亂

杰按三陰下利而腹痛者裏寒也宜溫也四逆湯
附子理中湯腸鳴泄瀉而痛者裏虛有寒也宜小
建中溫中散寒悸者陽氣虛也煩者陰血虛也與
此湯先建其裏倍芍藥者酸以斂陰陰收則陽歸
附矣 喻嘉言曰虛勞病至於亡血失精精血枯
槁難為方矣急宜建其中藏使飲食進而陰血旺
故但用稼穡作甘之味生其精血而酸辛鹹苦絕
所不用舍是無良法也

桂枝

生薑

三兩

甘草

一兩炙

大棗

十二枚

芍

藥

六兩

入飴糖一升微火解服

此即桂枝加厚
藥湯但桂有厚

升微煎溫服

太按陽受氣於胸中陽虛則陰邪得以中之陰寒之氣逆而上冲橫格於中焦故見高起痛嘔不可觸近之症 蜀椒辛熱入肺散寒入脾暖胃入腎門補火乾薑辛熱通心助陽逐冷散逆人參甘溫大補脾肺之氣飴糖甘能補土緩可和中所以太祛下焦之陰而復上焦之陽也

小建中湯

仲景

治傷寒陽脈瀼陰脈弦腹中急痛

傷寒二三日心悸而煩

通治虛勞悸衄裏急腹痛

夢遺失精

生用

杰按陰氣爲陽熱所灼也用此以收攝其欲亡之微陰故沈謂子煩陰虛火甚者宜服此

祇寒

大建中湯

金匱

治心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中

寒氣上衝皮起出見有頭足上下痛而不可近者

杰按心爲陽寒爲陰寒乘於心陰陽相激故痛寒乘於脾脾冷不消水穀心脾爲子母之藏爲邪所乘故痛而嘔復不能飲食也

蜀椒

二

乾薑

四

人參

二

煎去滓入飴糖一

芎藭二兩

右六味為散取方寸七酒和日三服

膠艾湯

金匱

治婦人衝任虛損經水淋瀝及血虛下

痢并妊娠腹痛為胞阻

當歸

三兩

芍藥

四兩

乾地黃

六兩熟

芎藭

二兩

艾

葉

三兩

阿膠

甘草

各二兩

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去渣納

膠令消盡溫服一升日三

仲景黃連阿膠湯

治傷寒少陰病得之二三日以

上心煩不得臥

黃連

四兩

黃芩

一兩

芍藥

二兩

阿膠

三兩

鷄子黃

二枚

芎歸湯

一作歸芎湯未知
是一是二須考

治產後

血虛頭痛胎動下

血服此即安子死腹中服此即下
催生神效亦名當

歸湯若腹疼加桂若腹痛自汗頭眩少氣加羊肉

當歸三五錢

川芎二錢

錢

若為末

名佛手散又名一

奇散又名君臣散

又有神妙餅
手散未考

加味芎歸湯

川芎當歸各一兩

白死龜板一具酥

炙生過男女婦人頭髮一握燒

性治分塊交骨
不開或五七

日不下垂死者每用
兩水煎服良久自下

當歸芍藥散

金匱

治懷妊腹中疝痛

當歸

芍藥

一兩

茯苓

四兩

白朮

四兩

澤瀉

半兩

歸脾湯生濟

治心脾受傷不能攝血與血妄行及婦

人帶下

人參 白朮炒土 茯神 棗仁

炒

龍眼肉二錢

黃耆一錢半炙 當歸酒洗 遠志一錢

木香 甘草五分

炙 薑棗煎

四物湯 治一切血虛及婦人經病

當歸酒洗 生地黃 芍藥各二錢炒

芎藭一錢半

奇效四物湯 治失血內崩

當歸酒洗 熟地黃 芍藥炒

川芎 阿膠 艾

葉 黃芩炒各一錢

女科輯要 卷下

吳

八珍湯

治心肺虛損氣血兩虛

心主血肺主氣四君補氣四物補血

人參

白朮

炒

茯苓

甘草

當歸

酒洗

生地

芍藥

芎藭

十全大補湯

八珍再加黃耆以助陽固表加肉桂以引火歸元

金匱曰虛者十補勿瀉之是也

補中益氣湯

東垣

治一切清陽下陷

中氣不足之證

黃耆

蜜炙一錢半

人參

甘草

炙

錢

白朮

土炒

陳

皮

留白

當歸

五

升麻

柴胡

三

薑三片棗二

枚煎

絲生薑炒蒜各四兩蜜調為丸

又丹溪青娥丸止用故紙四兩仲四兩生薑二兩

胡桃肉三個蜜九桐子大每服四五十九丸鹽酒下

黑錫丹治陰陽不升降上盛下虛頭目眩運

黑鉛二兩硫黃二兩將鉛鎔化漸入

地上出火毒研至無聲為度

參苓白朮散治脾胃虛弱飲食不消或吐或瀉

人參白朮炒土茯苓甘草炙山藥炒扁

豆炒薏仁炒蓮子肉去心炒陳皮砂仁桔

梗為末每三錢棗湯或米飲調服

不足尺脈弱者宜之

亦治婦人轉胞

前方加黃柏知母各二兩名知柏八味丸治陰虛火盛尺脈旺者宜之

腎氣丸

金匱

桂附八味丸加車前牛膝劑用地黃四兩 山藥

以下皆一兩 茯苓三兩 附子五錢

製

杰按金匱要畧用杜枝無車前牛膝治婦人轉胞

此名加味腎氣丸係治水腫

青娥不老丸

集解祇名青娥丸未知是一是二

治腎虛腰痛

破故紙

十兩酒蒸爲末

胡桃肉

十二兩去

杜仲

一兩切

以人多樂為痘醫耳

集方

論中所刻各方有彼此互見者集錄於此以便簡閱其專治者不復贅

補養

門類及分兩炮製牛參初菴醫方集解所錄

六味丸

錢仲陽

治肝腎不足真陰虧損精血枯竭

地黃

砂仁酒拌九蒸九晒八兩

山茱肉

酒潤四兩

山藥

四兩

茯苓

乳丹

皮澤瀉

各三兩

蜜丸空心鹽湯下冬酒下

六味地黃湯

治同上

前方煎服

八味丸

崔氏

前方加肉桂附子各一兩名桂附八味丸治相火

弟則後長沙而精於醫者。一方一論。具擬是中。迺他
書所無。有挾是而過邯鄲。庶無道少之患哉。其積德
求子。與夫安產藏衣吉凶方位。皆非醫家事。故削不
載云。

雄按若帶下。直婦人一病耳。未必人人病此。何疑
扁鵲問貴婦人。卽爲帶下醫。緣帶下本女子生而
卽有之事。原非病也。後人以帶脈不主約束一言。
遂以女人之遺濁。稱爲帶下之證。然則扁鵲之爲
帶下醫。猶今之幼科自稱痘醫也。痘雖幼科之一
證。而亦人人必有之事。且世俗無不貴小兒者。所

燦然可觀。是爲大全良方。良方出而閭閻之調將大備矣。然其論多采巢氏病源。什九歸諸風冷藥偏。曠熱未有條分縷晰其宜否者。近代薛己新甫始取良方增注。其論酌寒熱之中。大抵依於養脾胃補氣血。不以去病爲事。可謂救時之良醫也已。第陳氏所葺多上古專科禁方。具有源流本末。不可沒也。而薛氏一切以己意芟除。變亂使古方自此湮沒。余重惜之。故於是編附存陳氏之舊。而刪其偏駁者。然亦存十之六七而已。至薛氏之說。則盡收之。取其以養正爲主。且簡而易守。雖女子學習無難也。若易水瀝水師。

深許也。唐大中初，白敏中守成都，其家有因免乳死者，訪問名醫，得咎殷備，集驗方三百七十八首以獻。是爲產寶。宋時，漢陽李師聖得產論二十一篇，有說無方。醫學教授郭稽中，以方附焉。而陳無擇於三因方，評其得失，詳矣。娶醫杜莼，又附益之。是爲產育寶慶集。臨川陳自明良甫，以爲諸書綱領散漫，而無統節目，簡畧而未備。醫者局於簡易，不能深求，偏覽有纔進一方不效，輒束手者。有無方可據，揣摩臆度者。乃采摭諸家之善，附以家傳驗方，編葺成篇，凡八門，門數十餘體，總三百六十餘論。論後列方，綱領節目。

子

雄黃

各五錢

銅綠

四錢

末之煉蜜丸每重四錢

以方內雄黃爲衣坐入玉門重者二次必愈

王宇泰女科證治準繩序云婦人有專治方舊矣史
稱扁鵲過邯鄲聞貴婦人卽爲帶下醫語兼長也然
帶下直婦人一病耳調經雜證懷子免身患苦百出
療治萬方一帶下寧據盡之乎世所傳張長沙維病
方論三卷婦人居一焉其方用之奇驗奈弗廣何孫
真人著于金方特以婦人爲首蓋易基乾坤詩首謁
睢之義其說曰特須教子女學習此三卷婦人方令
其精曉卽於倉卒之秋何憂畏也而精於醫者未之

不必治其吹也。

陰癢

善邑西門外三里有婦陰中極癢難忍因寡居無人轉述醫者莫知病情治皆不效至蘇就某天士診微露其意葉用蛇床子煎湯洗內服龜鹿二仙膠四日而愈。

陰蝕有用猪肝煮熟削如槌鑽孔數十納陰中良久取出必有蟲在肝孔內另易一槌納之蟲盡自愈亦良法也。

雄按尚有陰挺一證用飛蟬

六兩

桃仁

一兩

五味

以白粉少許和合相得如棗大綿裹納之

陰吹

胃氣下泄陰吹而正喧。此穀氣之實也。猪膏髮煎導之。

猪膏半斤

亂髮

如鷄子大二枚

和膏中煎之髮消藥

成分再服

雄按陰吹亦婦人恆有之事。別無所苦者亦不爲病。况屬隱微之候。故醫亦不知耳。俗傳產後未滿月而啖葱者必患此。惟吹之太喧而大便難燥乃稱爲病。然仲聖但潤其陽明之燥。則府氣自通。仍

所云咽中帖帖如有炙肉吐之不出吞之不下是也

半夏厚樸湯 半夏一升 厚樸三兩 茯苓四兩

生薑五兩 蘇葉二兩 水煎分四服 日三夜一

臟燥

婦人臟燥悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘麥大

棗湯主之

甘草三兩 小麥一升 大棗十枚 水煎三分

服

陰寒

婦人陰寒溫陰中坐藥蛇床子散主之 蛇床之末

柴胡增劇詢其病情云醒時下體惡寒自憤時亦
嘗牽被斂衣因悟此證平素必患帶下且完姻未
久隱曲之事未免過當復值經來過多精血兩虧
陰陽並竭其惡寒發熱由陰陽相乘所致非外感
熱邪深入也悞投發散清熱證同亡陽傷寒論云
亡陽則譫語內經云脫陽者晁鬼是也因用腎氣
丸早晚各二錢神氣即清隨以從蓉易桂附數劑
全愈

此即前所云似是實非之證
不可不辨者也堯封自記

咽哽

金匱婦人咽中如有炙脔半夏厚樸湯主之 千金

不應藥入則乾嘔脈象弱而不大因思弱脈多火
胃液乾燥所以作嘔遂用白虎湯加生地麥冬二
劑熱退神清唯二十餘日不大便爲苦與麻仁丸
三服得便而安

一室女發熱經來醫用表散藥增劇譫語夜甚投
小柴胡不應夜起如狂或疑蓄血投涼血消瘀藥
亦不應左關脈弦硬搏指詢知病從怒起因用膽
草黃芩山梔丹皮羚羊角蘆薈甘草歸身等藥煎
服一劑知四劑愈

張儀表令愛發熱經來昏夜譫語如見鬼狀投小

投以小柴胡湯加生地二服不汗而熱遂除
又一熱入血室證醫用補血調氣藥治之數日遂成
血結胸或勸用前藥許曰小柴胡已遲不可行矣刺
期門則可請善針者治之如言而愈或問何爲而成
結胸許曰邪氣乘虛入於血室血爲邪所迫上入肝
經則譫語見鬼復入膈中則血結於胸中矣故觸之
則痛非藥可及當用刺法

一婦熱多寒少譫語夜甚經水來三日病發而止
本家亦知熱入血室醫用小柴胡數帖病增舌色
黃燥上下齒俱是乾血余用生地丹皮麥冬等藥

陳良甫曰。脈遲身涼而胸脇下滿如結。胸狀譫語者。當刺期門穴。下針病人五吸。停針良久。徐徐出針。凡針期門穴。必瀉勿補。肥人二寸。瘦人寸半。

許學士治一婦。病傷寒發寒熱。遇夜則如見鬼狀。經六七日。忽然昏塞。涎響如引鋸。牙關緊急。瞋目不知人。病勢危困。許視之曰。得病之初。曾值月經來否。其家云。經水方來。病作而經遂止。後一二日發寒熱。晝雖靜。夜則見鬼。昨日不省人事。許曰。此是熱入血室。證。醫者不曉。以剛劑與之。故致此。當先化痰。後治其熱。乃急以呷散投之。兩時許。涎下得睡。卽省人事。次

暮則譫語如見鬼狀者此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈

又婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之

又婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

沈按論言勿犯胃氣及上二焦者謂不可攻下并不可吐汗也然有似是實非之證不可不辨

衰多益寡如亡血液虧孤陽上冒等證而欲望其
補血不亦愚哉。芎藭有車輪紋其性更急於當歸。
蓋物性之偏長於通者必不長於守也。世人不取
用芎藥而恣用歸芎何其顛倒哉。余謂今人血虛
而熱者爲多。產後血液大耗孤陽易浮。吳氏此言
深中時弊。又論達生篇所用方藥未可盡信皆先
得我心之固然者。詳見解產難。醫者宜究心焉。

雜病

熱入血室

仲景傷寒論云。婦人傷寒發熱。經水適來。晝日明了。

盈孟以爲必死。日服人參錢許。竟不死。明年春桃花大放。仍無恙。直至秋分節候。方斃。此婦抑鬱不得志。誠是肝病。然不死於春而死於秋。何哉。豈肝病有二。其太過者死於旺時。其不及者死於衰時耶。此證本屬肝病。繆以坎炁補腎而愈。亦理之不可解者。

外有方附後瘍科方選中

雄按吳鞠通曰。當歸芎藭爲產後要藥。然惟血寒而滯者爲宜。若血虛而熱者。斷不可用。蓋當歸香竄異常。甚於麻辛。急走善行。不能靜守。止能運血。

卽以花蘂摘散鋪貼患處三兩次可愈卽已成硬

塊者亦可消散

曾經治驗數人
陳載安附識

乳巖

坎炆洗淨切薄焙燥研末日喫一條酒下約二十條

效

繆德仁治驗
年以內者效

又狗糞東丹獨靈蒜三味搗勻攤布上勿用膏藥令
粘貼上微痛數日可愈

沈按乳巖初起堅硬不作膿其成也肌肉疊起形
似山巖病起抑鬱不治之證方書云桃花開時死
出鮮血者死余見一婦患此已四年診時出鮮血

消屢治經驗野芥菜一名天芥菜又名鸚哥草似芥菜而畧矮小其根數出如蘭根用以治乳想其形似乳囊也故用有驗

春圃附載

乳癰紅腫方發

活小鯽魚一尾剖去腸同生山藥寸許搗爛塗之少頃發痒卽愈屢驗無山藥卽芋奶亦可

乳癰已成

胡桃膈瓦上焙燥研末每服三錢紅糖調勻溫酒送下三服無不全愈

又方用玫瑰花五七朵乾者可醇酒煎服燙酒極熱沖服亦可

無子喫乳乳不消。合人發熱惡寒。用大麥芽二兩炒爲末。每服五錢白湯下。丹溪

乳頭碎裂

丹溪老黃茄子燒灰傅之。綱目丁香末傅之

吹乳

繆仲淳云。妒乳內外吹乳。乳巖乳癰。不外陽明厥陰二經之病。橘葉最妙。又用生半夏一箇研末。生葱頭一段研裹左右。互塞鼻神驗。又於山中掘野芥菜。去葉用根洗淨搗爛。無灰酒煎數滾。飲一二次。卽以渣遏患處。凡乳癰未成。或腫或硬。或脹痛者。無不立

入再服失笑散芎歸湯調理之。如肉線斷則不可治矣。

乳汁不通

涌泉散。山甲炮研末。酒服方寸匕。日二服。外以油梳

梳乳卽通。

見經疏

陳自明婦人良方曰。予婦食素。產後七日乳汁不行。赤小豆一升煮粥食之。當夜卽行。一婦乳汁不行。煎當歸八錢服卽通。王不留行白通草穿山甲是要藥。

回乳

歸一錢半升麻五分三帖連服之卽收上得汗通身
方安但下翳沾睛處乾者落一片約五六兩重蓋脂
膜也食進得眠診其脈皆濇左畧弦視其形卻實與
白朮白芍各半錢陳皮一錢生薑一片煎二三帖以
養之

水道下肉線

一產後水道中下肉線一條長三四尺動之則痛欲
絕先服失笑散數帖次以帶皮薑三觔研爛入清油
二觔煎油乾爲度用絹兜起肉線屈曲於水道邊以
前薑蘖之冷則爛之六日不爛者其大半二六日卽盡

若氣血充盛必可生。遂用四物湯加入參與百帖。三年後復有子。

治子宮下黃者一錢。人參一錢。當歸七分。升麻三分。甘草二分。作一帖。煮食前服。外用五倍子末泡湯洗。又用末傅之。如此數次。宜多服藥。永不下。

產戶下物

丹溪云。一婦三十餘歲。生女二日後。產戶下一物如手帕。下有帕尖。約重一觔。子思之。此因胎前勞乏傷氣。或肝痿所致。卻喜血不甚虛耳。其時歲暮天寒。恐冷乾壞了。急與炙黃耆二錢。人參一錢。白朮五分。當

陳無擇云。產後陰脫如脫肛狀。及陰下挺出。逼迫腫痛。舉動房勞。卽發清水。續續小便淋瀝。硫黃烏賊骨各二兩五味子二錢半。爲末。糝之日三次。

子宮下

丹溪云。一產子後陰戶下一物如合鉢狀。有二歧。其夫來求治。予思之。此子宮也。必氣血弱而下墜。遂用升麻當歸黃耆幾帖與之。半日後其夫復來云。服二次後覺响一聲。視之已收。陰戶訖。但因經宿乾著。席上破一片如掌心大。在婦某處。在家哭泣。恐傷破。不復能生。予思此非腸胃乃脂膏也。脂肉破尚可復完。

而安。蓋令氣血驟長，其腠自完，恐少緩亦難成功矣。又產時尿胞被傷，小便淋瀝，用二驚蘭燒存性作末服一月可愈。繆德仁治驗

玉門不閉

薛立齋云：氣虛血弱，十全大補湯主之。

玉門腫脹焮痛

薛云：是肝經虛熱，加味逍遙散主之。

坐草過早，產戶傷壞，紅腫潰爛，痛不可忍，用蒸包子

籠內荷葉煎湯洗，日三次，兩日可愈。

繆德仁治驗

陰脫

尿血

大全云產婦尿血而黃芩少食此肝木乘脾土也
用加味逍遙散補中湯煎服可愈

尿胞被傷小便淋瀝

丹溪云嘗見收生者不謹損破產婦尿脬致病淋漓
遂成廢疾有一婦年壯難產得此因思肌肉破傷在
外者皆可補完尿脬雖在裏諒亦可治遂診其脈虛甚
予曰難產之由多是氣虛產後血氣尤虛試與峻補
因以參耆爲君芎歸爲臣桃仁陳皮茯苓爲佐煎以
豬羊脬煎湯極飢時飲之但劑小率用一兩至一兩

各二錢 琥珀 一錢 花蕊石 各一錢 爲細末 醋糊丸 如

子大 每用一二九 炭火煨紅 投入生薑自然汁
中浸碎 以童便合酒調灌下

小便不通

產乳集用鹽填臍中令平 葱白搗鋪一指厚 安鹽上
以艾炷餅上炙之 覺熱氣入腹內卽通 最靈

沈按此法不效 必是氣虛不能升舉 黃耆補氣之
中已寓生升之性 用白芍爲君 五錢 麥冬能清上源
用以爲臣 一錢 五苓散草通利達下 用以爲佐
八分水煎

已又心痛作既而目睛痛如割如刺更作更止相去
無瞬息閒每頭痛欲取大石壓良久漸定心痛作則
以十指抓臂血流滿掌痛定目復痛復以兩手自剋
目如是十日不已眾醫無計進黑龍丹半粒疾少閒
中夜再服乃瞑目寢如平時至清晨下一行約三升
許如蝗蟲子病減半已刻又行如前痛盡除
黑龍丹 治產難及胞衣不下血迷血暈不省人事

當歸 五靈脂 川芎 良薑

熟地 各二兩 剉碎入

砂鍋內紙筋鹽
固濟火煨過

百草霜 一兩

硫黃 乳

兆也。敗血阻住陰陽升降道路，不能旋轉。陽盛，
自熱；陰盛，處自寒。所以偏熱偏寒，用澤蘭、查肉、劉
季奴、蘇木、桃仁、琥珀等藥兩劑，病勢減半。繼服不
應，遂更醫雜治，以至不起。由今思之，此證不但血
阻，必兼痰滯。我師見及阻住陰陽升降道路，病源
已經識出，特跳不出產後消瘀圈子耳。倘通瘀不
應，卽兼化痰。或者如前案金婦得起，未可知也。此
詩古詩尚初學。我師見識過人，特未悟徹痰滯一證
惜哉。

前案郭茂恂嫂金華君產七日不食，始言頭痛，頭痛

之室。娩後患此。醫治不能除根。再產亦然。延已數
年。繼復懷妊。病發益頻。余用大劑滌痰藥。服月餘。
產後安然。病根竟刈。

震澤一婦。產後十餘日。延我師金大文診視。余從
據述。新產時證似虛脫。服溫補藥數劑。近日變一
怪證。左邊冷。右邊熱。一身四肢盡然。前後中分冷。
則如冰。熱則如炭。鼻亦如之。舌色左白右黑。師問
曰。此是何病。用何方治。余曰。書未曾載。目未曾睹。
不知應用何方。師曰。奇證當於無方之書求之。經
不云乎。左右者。陰陽之道路也。陰陽者。水火之

病痰滯居半千金半夏茯苓湯所以神也至臨產
時痰涎與惡血齊出方得無病若止血下面痰飲
不下諸病叢生故產後理血不應六神湯爲要藥
此證初起不過痰飲阻滯氣道作腫血本無病用
五苓腎氣腫減者痰滯氣道得熱斬開故也久投
不已血分過熱致吐血兩次至若半身不遂口眼
歪斜舌絡不靈俱是痰滯經絡見證卽厥亦是痰
迷所致並非虛脫故消痰通絡病自漸愈何奇之
有

雄按此等卓識皆從閱歷而來朱生甫令郎仲和

血而定投以消瘀。忽然口閉目開如脫狀。伊母一夜煎人參三錢。灌之得醒。醒來索飯喫一小盃。近口又厥。灌人參不醒。已三晝夜矣。余遂往診。右手無脈。因腫極。不以爲怪。左脈浮取亦無。重按則如循刀刃。余曰。此是實證。停參可醫。遂用臈星半夏石菖蒲橘皮天蟲地龍紫草水煎。入竹瀝薑汁一劑。知四劑。手足能舉。不換方。十二劑。能出外房診脈。諸病悉退。惟舌音未清。仍用前方。而愈。金問奇病之源。余曰。人身臟腑接襲受病。中遂增一物。臟腑之機括爲之不靈。五液聚爲痰飲。故胎前

受風而成宜服此藥戴氏證治要法名獨行散

賈似道悅生隨抄呼爲再生丹

指迷方加
當歸等分

沈云丁丑三月練塘金虞旬第四媳產後變證伊
郎來請先述病狀云上年十月生產甚健至十二
月初旬面上浮腫驅風不應加麻黃三帖通身脹
腫小便不利更用五皮雜治反加臍凸更用肉桂
五苓小便畧通脹亦稍減續用桂附八味其腫漸
消惟右手足不減忽一日口眼歪斜左手足不舉
舌不能言因作血虛治變爲俯不得仰數日後吐
黑血盈盂吐後俯仰自如旬餘復不能仰又吐黑

心眼倒策吐瀉欲死。此藥清神氣通血脈其效如神。

荊芥

炒

爲末每服三錢黑豆泮酒調服童便亦

可。口噤攤開灌之。或吹鼻中。

李瀕湖曰此方

諸書盛稱其妙姚僧坦集驗方以酒服名如聖

散藥下可立效陳氏方名舉卿古拜散蕭存敬

方用古老錢煎湯服名一捻金許叔微本事方

云此藥要有奇效神聖之功一產後睡久及醒

則昏昏如醉不省人事醫用此藥及交加散云

服後當睡必以左手搔頭用之果然告殷產寶

方云此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱或坐草

脈亦隸少陰。此脈急縮與少陰大有關會。此用麻兼用附之深意也。使置此不講。徒執氣虛血虛以治產後百病。業醫亦覺太易矣。

小續命湯 治產後中風。身體緩急。或頑痺不仁。或口眼喎斜。牙關緊急。角弓反張。

防風一錢 麻黃去節 黃芩 白芍 人參

川芎 防己 肉桂各七分 附子炮

杏仁各五分 甘草四分 加生薑水煎服

華陀愈風散 治產後中風。口噤。牙關緊閉。手足攣。癱如角弓狀。亦治產後血暈不省人事。四肢強直。或

五和車馬
氣血兩虛者不可輕用。假使除卻麻黃。何以散客
寒。除卻附子。何以保真陽。特不可用於有汗之柔
痙耳。有汗柔痙更有兩種。一則因虛而受外來之
風。一則血虛則筋急。並無外感之風。有風者雖汗
出。必然惡風。主以華元化愈風散。祇血虛而無風
者。必不惡風。純宜補血。

又按人身氣血之外。更有真陽真陰。藏在坎中。亦
立命之根基。胎系於腎。腎司二陰。產育之時。下焦
洞開。坎中陰陽有不大損者乎。況背後夾脊四行。
俱太陽經脈。太陽之裡。卽是少陰。脊裡一條是督。

可廢臨診時詳之

沈按仲景論腰背反張爲瘧。無汗者名剛瘧。主以葛根湯。有汗者名柔瘧。主以桂枝加葛根湯。桂枝湯乃治風主方。故有汗之瘧屬風。葛根湯中用麻黃。麻黃乃散寒主藥。故無汗之瘧屬寒。仲景治少陰傷寒未見吐利之裡證者。用麻黃附子細辛湯。麻黃附子甘草湯。微發汗。蓋寒邪乘少陰之虛而欲入。急以附子保坎中之陽。而以麻黃散外感之寒。眞神方也。小續命湯雖非仲景之製。方中用此二味。正見攻守相須之妙。而叔卿反云麻附二味。

腰背反張

薛云產後腰背反張。肢體抽搐。因亡血過多。筋無所養。使然大補氣血。多保無虞。若發表驅風。百不全一。武叔卿云。寒主收引。背項強直。寒在太陽經也。諸家皆主續命湯。此古法也。郭氏不問產後虛實。邪之有無。概用續命。似覺一偏。至薛氏專主亡血過多。非十全大補不可。是或一見。乃夷堅志按以大豆紫湯獨活湯而愈。亦主於風矣。是續命固不爲妄也。但本方有麻黃附子氣血兩虛人不可輕用。而郭氏論又囑人速灌取汗而解。偏不以麻黃爲忌。何也。二說俱不

瀉吐出厚痰數碗。嗽仍不止。更用二陳加旋覆。當歸少減。稍可喫飯。因嗽不減。痰漸變薄。加入生地四錢。食頓減。嗽轉甚。通身汗出。脈象微弦。用歸身三錢。茯苓二錢。炒甘草一錢。紫石英三錢。因汗欲用黃耆。因嗽又止。推敲半晌。仍用炒黃耆三錢。一服汗止而嗽亦大減。十劑而安。

口眼喎斜

丹溪云。必須大補氣血。然後治痰。當以左右手脈分氣血多少治之。切不可作中風治。用小續命湯治風之藥。

宜腎氣湯。先是證皮薄色白可證。人身營衛之氣通則平。滯則脹。頑痰瘀血皆能阻滯氣道作腫。是證皮厚色不變。以脈弦者爲痰脈結或芤者爲血。分證分別論治。用藥更有一種血虛而致氣滯者。其腫不甚。色帶淡黃。宜歸身爲君。佐以白朮陳皮茯苓之類。

咳嗽

一婦妊七八個月。痰嗽不止。有時嘔厚痰數碗。投二陳旋覆。不應。用清肺滋陰愈甚。遂不服藥。彌月而產。痰嗽如故。日夜不寐。三朝後二陳加膽星竹

如神湯治瘀血腰痛。延胡當歸肉桂等分水煎服。
沈按腰痛不見前證者。多屬肝腎虛。宜當歸杜仲
補骨脂之類。

遍身疼痛

薛云以手按之痛甚者。血滯也。按之痛緩者。血虛也。
浮腫

沈按產後浮腫。先要分水病。氣病。水病。皮薄色白
而亮如裹水之狀。氣病皮厚色不變。經云腎者胃
之關也。關門不利。聚水生病。蓋產後腎氣必損。胃
底陽微。不能蒸布津液。通調水道。此聚水之由也。

如千金硝石丸人參硝黃並用丹溪猶以爲猛劑
學者但將丹溪治積聚諸案細讀自有悟處而黑
神丸生熟黍並用尤勿輕試每見服之謬事因思
黍身爲癰之言則飛補之說其可惑乎

腰痛

大至產後惡露方行忽然斷絕腰中重痛下注兩股
痛如錐刺入骨此由血滯經絡不即通之必作癰疽
宜桃仁湯五香連翹湯

沈按前方不穩不若用桃仁紅花地龍肉桂沒藥
當歸爲妥

雄按古今醫案載一婦產後惱心左少腹結一處
每發時小腹脹痛從下攻上膈乳上皆痛飲食
入胃卽吐。徧治不效。葉香巖用
酒炒當歸二錢。白製鹿角霜。菟絲子各一錢五分。
生查肉三錢。川芎八分水煎送。四。魏九七分八劑
而愈。次用烏雞煎丸。原方半料。水不復發。又云消
積之方。如桃仁煎。用大黃。蠱蟲。巴霜。東垣五積丸
俱用。川烏。巴霜。局方聖散子。三。後煎丸俱用礞砂
乾漆。此皆峻厲之劑。用而中病。固有神效。若妄試
輕嘗。鮮不敗事。試閱葉案。積聚門。竝無古方。狠藥。

婦科要略卷一
通歸脾加減治驗

小腹痛瘀血成膿

薛案載一產後小腹作痛行氣破血不應脈洪數此瘀血成膿也用瓜子仁湯二劑痛止更以太乙膏下膿而愈產後多有此證雖非瘕用之神效脈洪數已有膿脈但數微有膿脈遲緊但有瘀血尚未成膿下血即愈若腹脹大轉側作水聲或膿從臍出或從大便出宜用蠟礬丸太乙膏及托裏散凡瘀血宜急治緩則化爲膿難治若流注關節則急骨疽失治多爲壞證

二錢炙甘草四分加研爛松子仁五粒

蕭賡六云下血過多肝經血少腹滿其脈弦者以熟地莢肉爲君加白芍木瓜蒺藜一劑可止有難產久坐風入胞門致腹痛欲絕其脈浮而弦續斷一兩防風五錢服之立愈

腹中虛痛胸項結核

詳按一產婦腹中有物作痛投破氣行血藥尤甚肢節胸項各結小核離於肉裏此肝血虛也蓋肝爲藏血之臟而主筋血虛則筋急而攣見於肢節胸項者以諸筋皆屬於節而胸項又肝之部分也用八珍造

爲藏血之臟。血去肝虛。其氣易動。一關氣腦。陡然
腕腹大痛。治法血虛宜歸者。建中消食。惟查肉炭
最妙。兼和血也。消瘀宜奪命散。感寒者。輕則炮薑
艾葉。重則桂附茱萸。肝氣一痛。養血藥中加川棟
橘核。苦以泄之。重則烏梅。元辛散酸收。苦泄並用。
杰按一婦產後腹痛。令其夫以手按之。小腹痛尤
甚。下惡露而痛仍不減。知其非瘀。乃燥糞也。予藥
一劑。大便秘下而愈。姜用川治驗。炮薑五分。丹
皮二錢。歸身三錢。川芎一錢五分。山查二錢。炒枳
殼一錢五分。炒麻仁二錢。苤爛桃仁泥二錢。生地

褚侍中云。童便降火甚速。降血甚神。故爲療厥逆
頭疼之聖藥。若血虛受風。宜一奇散。卽芎歸湯也。
薛按。載一產婦頭痛。日用補中益氣已三年。稍勞則
惡寒內熱。擬作陽虛治。加附子一錢於前湯中。數劑
不發。

胃脘痛腹痛少腹痛

沈按。有血瘀血虛。停食感寒。肝氣之異。手按痛減
者。血虛也。按之痛增者。非停食卽瘀血。停食則右
關脈獨實。且有噯哺氣。瘀血則所下惡露必少。得
熱卽減者。感寒也。至若厥陰肝脈抵小腹。挾胃。又

三才圖會卷一
呷調下。此藥雖微能愈大病。慎勿忽視。

千金膠蠟湯治產後利。黃蠟二基子大阿膠二

錢當歸二錢半黃連三錢黃檗一錢陳米半升煎

湯煎藥服

便解

金匱云亡津液胃燥故也

沈按當用當歸肉蓯蓉生首烏麻仁杏仁不應用

麻仁九四五十丸

頭痛

沈按陰虛於下則陽易升上致頭痛者童便最妙

意忽大便澹泄數次覺神氣不寧問其所苦曰熱

白渴語言皆如抖出脈虛細數有七至我師金大

文診之曰此陽脫證也屬少陰用生附子三錢水

切片煨如炮乾薑八分炒甘草一錢炒白芍一錢

五分水煎衝入尿一調羹青魚膽汁四小茶匙因

中無猪胆故以此服畢即睡覺來熱渴俱除續用

代即羊胆亦可黃耆建中湯加丹參蘇木二劑而安

產後惡露不行餘血滲入大腸洞泄不禁或下青

黑物的奇散極驗荆芥大者四錢五錢於盞內燃火

燒成灰不得犯油火入麝香少許研勻沸湯一兩

三個一齊病厥四劑而愈

雄按觀此案雖可見氣虛不能收攝者宜甘溫以補之酸澀以收之不用辛熱走泄以助火而食氣也

鄒氏婦產後便泄余用參附溫補藥未效新城吳一診云虛寒而兼下陷用補中益氣加熟地茯苓桂附應手取效以是知方論內言下虛不可升提不盡然也

陸姓婦產後三日發疹細而成粒不稀不密用荆芥蟬蛻枯子等藥一劑頭面俱透越一日漸有回

三錢南棗肉三錢煎服神效

與眩暈內呂
婦一技參證

泄瀉

乙亥初夏。傅木作婦產時去血過多。隨寒戰汗出。便瀉不止。余用太劑真武乾薑易生薑兩劑戰少定而汗瀉如故。又服兩日寒戰復作。余用補中湯無人參加。謂予。謂翻病者云。我肚裡大熱。口渴喜飲。然汗出下利寒戰。仍不減。正疑神思慮。聞其母曰。彼大孔如漏。不能收閉。諒無活理。余改用黃耆五錢炒北五味兩錢。搗白芍二錢炒歸身一錢五分炒甘草一錢五分炒。茯苓二錢山藥二錢大棗

仲景曰病有酒發惡寒而後發熱者陽脈不足陰往乘之陰脈不足陽往乘之

沈按前條是瘀血後條是陰陽相乘甚則俱有戰慄者治瘀血宜奪命丹調補陰陽輕則歸者建中重則桂附八味

頭汗

王海藏云頭汗出至額而還額上偏多蓋額為六陽之會由虛熱蒸蒸而出也

沈按汗出不止屬氣血兩虛黃耆炒五錢白芍酒二錢歸身二錢棗仁炒二錢甘草炒一錢小麥炒

卽顯露者。惟舌苔。頗有可徵。或厚白而膩。或黃膩。黃燥。或有赤點。或微。舌赤。或口苦。或口渴。或胸悶。或洩熱。此皆溫淫。著熱之邪。內蘊。世人不察。再飲以糖酒。生化湯之類。則輕者重。而重者危。不遇明眼人。亦但知其產亡。而不知其死於何病。誤於何藥也。我見實多。每爲太息。其後條之。乍寒乍熱。亦當如是。諸察庶免。遺人夭殃也。

乍寒乍熱

武叔卿曰。血閉。蓋陽經榮衛行之不通。則寒。血閉於陰經。榮衛行之不通。則熱。必瘀通而後寒熱自己。

茯苓乾薑五味數味惡言多贅

發熱

沈按產後發熱所因不同當與證參看感冒者鼻塞亦不可過汗經有瘀血無汗之禁只宜芎歸湯停食者嘔腐飽悶宜平劑消食血虛發熱無別證者脈大而芤宜歸芪陰虛者煩渴脈細宜生地阿膠更有一種表熱裏寒下利清穀煩渴惡熱脈微細者此少陰危證宜四逆湯雄按暴感發熱可以鼻塞驗之苟胎前伏邪婉後陡發者何嘗有頭疼鼻塞之形證乎雖脈亦有不

喘

沈按有脫閉二證下血過多者是脫證喉中氣促
命在頃臾方書雖有參蘇飲一方恐不及待惡
露不快者是閉證以奪命丹可定如不應當作痰
治此皆急證更有種緩者婁全善所云產後喘
者多死有產二月洗浴即氣喘坐不得臥者五月
惡風得煖稍緩用丹皮桃仁桂枝茯苓乾薑枳實
厚樸桑皮紫蘇五味瓜蒌煎服即臥其疾如失作
汚血感寒治也按此亦是痰證所以能持久痰滯
陽經所以惡寒方中著力在瓜蒌厚樸枳實桂枝

呃逆

虛脫惡候人參送黑錫丹十全一二

杰按姜用川芎一兩載黑鉛乃水之精入北方
壬癸凡遇陰火衝逆重陽暴脫氣喘痰鳴之急證
同桂附回陽等藥用之立見奇功卽經云重劑是
也

又按姜又載何惟丹先生呃逆治驗方云傷寒呃
逆聲聞數家者用刀豆子數粒瓦上煨存性爲末
白湯調下二錢立止又本草綱目云病後呃逆刀
豆連殼燒服姜云此方宜入旋覆代赭湯

諸證既見。不斷余用理血藥。不應改用六神湯。四劑病去如失。

不能語

武叔卿曰。熱痰迷心。使然。膽星一錢。橘紅一錢。半夏一錢五分。石菖蒲一錢。鬱金一錢。水煎入竹瀝。一調羹。生薑汁三小茶匙服。按神昏不語。有虛有實。當參考證及脈。

聲啞。按屬腎虛。補腎之中宜兼溫通。

元生地四錢。茯苓二錢。山藥一錢五分。歸身

錢。肉桂五分。遠志五分。水煎服。

一成衣婦產後半月餘發狂打罵不休其夫鎖之磨上余付無極丸六錢分兩服酒下服畢卽愈越四五日復發又與六服後不復發

丁姓婦產後神昏語語如狂思露仍通亦不過多醫者議攻議補不一金尚陶前輩後至診畢曰待我用一平淡方試下去看川杜刮橘紅石菖蒲等六味一劑神氣清四劑霍然此方想是嬰驗故當此危證絕不矜持歸語舍弟賡虞答曰此名六神湯余未考其所自

甲戌孟春錢香樹先生如君產後微熱痞悶時時

開乃父何新之視脈虛弦浮大因拉余商治詢其
惡露雖無而腕腹無患乃投以牡蠣白真龜板鼈
甲琥珀川參甘草紅棗小麥之劑覆杯卽減數日
霍然此由血虛有素既晚則營陰下奪陽越不潛
設泥新產瘀衝之常例而不細參脈證則殺人之
事矣

發狂謔語

惡露不來者是血瘀宜無極丸惡露仍通者是痰迷
宜六神湯半夏麴一錢橘紅一錢膽星一錢石菖蒲
一錢茯神一錢旋覆花一錢水煎濾清服

庚辰春呂姓婦分娩次日患血暈畧醒一刻又目
閉頭傾一日數十發其惡露產時不少今亦不斷
脈大左關弦硬用酒化阿膠一兩衝童便服是夜
暈雖少減而頭汗出少腹痛有形寒戰如瘧戰已
發熱更甚投沒藥血竭奪命散二錢酒調服寒熱
腹痛發暈頓除惟嫌通身汗出此是氣血已通而
現虛象用黃耆五錢炒歸身二錢甘草一錢炒棗
仁三錢炒小麥五錢大棗三個煎服汗止而安
准按惡露雖少而胸腹無苦者不可亂投破瘀之
藥今秋周鶴庭室人新產眩暈自汗顫言曰不能

衛散亂營氣先絕故不

詳立齋云急用一味參

蘇飲加附子亦有得生者

眩暈昏冒

去血過多者宜重用阿膠水化畧加童便服

血去不多者宜奪命散沒藥去油二錢血竭一錢共

研末分兩服糖調酒下

二條宜與前惡露過多二條參看

錢姓婦產後發暈兩日不醒產時惡露甚少暈時

惡露已斷伊夫向鄰家討琥珀散一服約重二錢

許酒調灌下卽醒其藥之色與香俱似沒藥大約

卽是血竭沒藥之方

疼服者祇宜丹參丹皮元胡滑石益母草山查澤
蘭桃仁歸尾通草之類爲治慎毋妄施峻劑生化
湯最勿擅用

九竅出血

彙補云九竅出血死證恆多惟產後瘀血妄行九竅
出血有用逐瘀之藥而生者不可遽斷其必死此是
閱歷後之言不可忽畧雖無方藥其法已具

黑氣鼻衄

郭稽中云產後口鼻黑氣起及鼻衄者不治蓋陽明
爲經脈之海口鼻乃陽明所見之部黑氣鼻衄是營

一老嫗云產時被侍者挾落腰子使然用烏梅肉二

個煎湯服立效

嘉郡錢鄴
哉目略

惡露過多不止

伏龍肝二兩煎湯澄清。拌入阿膠一兩服如不應加

人參

惡露不來

輕則艾葉及奪命散重則無極丸寒凝者肉桂紅花
等藥併花蕊石散

雄按產後苟無寒證的據一切辛熱之藥皆忌惡
露不來腹無痛苦者勿亂投藥餌聽之可也如有

急以物半扎臍帶墜住使不上升然後將臍帶剪斷使血不入胞菱縮易下若水繫先斷胞升湊心必死

杰按保生錄覺胎衣不下產婦用自己頭塞口

中打一惡心卽下切須放心不可驚恐不可聽穩

婆妄用手取多致傷生又以草紙燒烟熏鼻卽下

芒硝三錢童便冲服立效

愈遂良先生曰

松郡一老穩婆包醫是證自帶白朮藥一包買牛膝

二兩同煎去渣冲童便半盃服立下

白朮藥定是元明粉元明粉

製其硝也

產後喜笑不休

硝爲腐死胎之藥

杰按佛手散亦下死胎胎死先宜服此不傷氣血服此不下次用平胃礮硝可也

凍產治驗 劉復真治府判女產死將殮取紅花濃煎扶女於凳上以綿帛蘸湯盪之隨以澆帛上以器盛之又煖又淋久而蘇醒遂產一男蓋遇嚴冬血凝不行得溫故便產也

逆產足先出用鹽塗兒足底橫產手先出塗兒手心杰按鹽螯手足痛便縮人俗乃謂之討鹽生也

胞衣不下

良驗此藥不寒不熱最是穩劑

雄按催生藥不宜輕用必胎近產門而不能卸下始可用之又須量其虛實或補助其氣血或展拓其機關寒者溫行熱者清降逆者鎮墜未可拘守成方面概施也

婦人良方曰加味芎歸湯入龜板治交骨不開 醋

油調滑石塗入產門爲滑胎之聖藥 花蘆石散治

血入胞衣服大不能下或惡露上攻 草麻子治胎

衣不下 佛手散治血虛危證 清魂散治血暈諸

證 失笑散治惡露腹痛不省人事 平胃散加樸

當歸四錢 人參一錢 牛膝二錢 川芎一

錢 龜板三錢 赭石三錢 研肉桂一錢 去皮

益母二錢 水煎服

雄按此方極宜慎用。夏月尤忌。必審其確係虛寒者始可服之。通津玉靈湯最妙。余用猪肉一味煎清湯服亦甚效。

如神散 路上草鞋一雙 名千里馬 取鼻梁上繩洗淨燒灰。童便和酒調下三錢。神驗。武叔卿濟陰綱目云。於理固難通。於用實靈驗。按千里馬得人最下之氣。佐以童便之趨下酒性之行血。故用之。

交骨如環不能開拆名鎖子骨能受孕而不能產
如懷娠必以晚難死此乃異稟萬中不得其一如
交骨可開者斷無不能晚者也方書五種不孕之
所謂螺者即螺字之譌也蓋驢馬交而生螺純牝
無牡其交骨如環無端不交不孕稟乎純陰性極
馴良而善走勝於驢馬然亦馬之屬也易曰坤為
馬行地無疆利牝馬之貞皆取象於此之謂也人
賦此形而不能安其貞則危於晚矣

催產神方

治胎漿已出胎不得下或延至兩三日

者一服即產

屢用有
神效

哉言乎若得兒身順下縱稽時日不必驚惶安心
靜俟可耳會稽施蘭生茂才誕時其母產十三日
而始下母子皆安世俗不知此理稍覺不易先自
慌張近有凶惡穩婆故爲惴惴妄施毒手要取重
價嚮而出之索謝去後產母隨以告類者有之奈
貿貿者尚誇其手技之高忍心害理慘莫慘於此
矣設果胎不能下自有因證調治諸法即胎在腹
中亦有可下之方自古方書未聞有醫割之劑加
諸投生之嬰兒者附識於此冀世人之憬悟而
勿爲凶人牟利之妖言所惑也但有一種髑形者

心懼而氣結不行也。經云：恐則氣下，恐則精怯。怯則上焦閉，閉則氣逆。逆則下焦脹，氣乃不行。得紫蘚飲

一服便產。

方見子懸門

雄按：難產自古有之。莊公寤生見於左傳。故先生如達不圻不副。詩人以爲異徵。但先生難而後生易理之常也。晚嫁者尤可必焉。然亦有雖晚嫁而初產不難者，非晚嫁而初產雖易，繼產反難者，或頻產皆易，間有一次甚難者，有一生所產皆易，一生所產皆難者。此或由稟賦之不齊，或由人事之所召，未可以一例論也。諺云：十個孩兒十樣生。至

水十分和勻喫產母面每喫一縮三喫盡收孕婦止
腹痛未必產連腰痛者將產胞繫於腎故也腹痛試
捏產母手中指中節或本節跳動方臨盆卽產

雄按中指跳動亦有不卽產者更有腰腹不甚痛
但覺痠墜而卽產者

兒未生時頭本在上欲生時轉身向下故腹痛難忍
此時婦當正身寬帶仰臥待兒頭到了產戶方可用
力催下若用力太早或束肚倚著兒不得轉身卽有
橫生逆生手足先出之患

許叔微曰有產累日不下服藥不驗此必坐草大早

欲產非果產也。一為試月。遽爾用力。是謂傷產。三曰
催產。正產之候。見血而難產。用藥催之。是謂催產。四
曰凍產。冬產血凝不生。五曰熱產。過熱血沸。令人昏
暈。六曰橫產。兒半轉。遽爾用力。致先露手。令穩婆
徐推兒手。使自牽耳。七曰倒產。兒身全未得轉。即為
用力。致先露足。令穩婆推足入腹。八曰偏產。兒未正
而用力。所致九曰礙產。兒身已順。不能生下。或因臍
帶絆肩。令穩婆撥之。十曰坐產。急于高處繫一手巾。
令母攀之。輕輕屈足坐身。可產。十一曰盤腸產。臨產
母腸先出。然後兒生。產後若腸不收。用醋半盞新汲

女科輯要卷下

靖王十雄孟英參

沈堯封先生輯

錢塘後學徐政杰藹輝補注

男之藩友珊校

產

杰按濟生產經曰胎前之脈貴實產後之脈貴虛胎前則順氣安胎產後則扶虛消瘀此其要也丹溪云產後脈洪數產前脈細小澁弱多死懷妊者脈主洪數已產而洪數不改者多主死

楊子建十產論

曰正產二日傷產未滿月而痛如

卷之四

卷之四

下

女科輯要

